

▲ 浙江省台州恩泽医疗中心（集团）恩泽医院 余军辉

Diagram illustrating the relationship between various organs and associated cancer types or markers:

- Left Side (Organ - Cancer/Marker):**
 - 甲状旁腺 (PTH)
 - 头颈部区域 (SCC)
 - 甲状腺 (降钙素 TG)
 - 食管 (SCC, CEA)
 - 肺、支气管 (HbE, Cyt21-3, SCC/CEA)
 - 肝 (AFP)
 - 胆囊、胆道 (CA19-9, CEA)
 - 类脂 (S-Ht)
 - 膀胱 (Cyt21, TPA, HNF23)
 - 前列腺 (PSA, PCAs)
 - 睾丸 (AFP/hCG, 胎前AP, LDH)
 - 皮肤/黑色素 (黑色素)
- Right Side (Organ - Cancer/Marker):**
 - 垂体
 - 乳腺 (CA15-3, CEA)
 - 胃 (CA72-4, CEA)
 - 胰腺 (CA19-9)
 - 结肠/直肠 (CEA, CA19-9)
 - 肾 (M2, PK, TPA)
 - 肾上腺皮质 (DHEA-C, 皮质酮)
 - 嗜铬细胞瘤/神经母细胞瘤
 - 卵巢 (CA12-5, CA72-4)
 - 子宫 (CA125, CA19-9)
 - 宫颈 (SCC, CEA)
 - 淋巴/骨髓系统 (淋巴细胞, 粒细胞)
 - 骨 (骨髓瘤, 成骨肉瘤)

▲ 广东省肇庆市高要区人民医院 张祝权

患者视角下的不良反应管理是一个复杂而重要的过程，了解并有效管理放疗不良反应需要患者、家属和医护人员的共同努力。通过加强教育与沟通、合理的饮食调整、适当的运动、心理支持以及必要的药物治疗等措施可以有效减轻患者的不良反应，提高患者的生活质量，保障治疗的顺利进行。同时，这也需要医疗团队、患者及其家属的共同努力和配合。