● 短新闻

日前,《新英

格兰医学杂志》就 Nerandomilast, 一种新型 的口服 PDE4B 选择性抑 制剂,治疗特发性肺纤维 化的Ⅲ期临床试验——

FIBRONEER-IPF 研究的

52周结果发表文章。文章

指 出, FIBRONEER-IPF

研究是特发性肺纤维化领

域近十年来首个达到研究

终点的Ⅲ期试验, 研究

结果表明,在52周的治

疗时间内, Nerandomilast

组较安慰剂组用力肺活

量下降幅度更少,且

Nerandomilast 具有可接受

的安全性。(NEnglJ Med.

5月18日在线版)



5月17日世界高血压日全球高血压防控行动倡议发布

控制高血压 保护十亿颗心脏

医师报讯 (融媒体记者 贾薇薇)高血压是威胁人类 健康的主要慢病之一,2025 年5月17日是第21个世界 高血压日。日前,由北京 力生心血管健康基金会和 《医师报》支持,第七届 中国高血压联盟参与发起 了"全球高血压防控行动 倡议", 呼吁制定相关政 策和投资, 使控制高血压 这一当今最有效且最具成本 效益的公共卫生干预措施之 一在全球范围内成为现实。

全球面临的挑战

如果不采取紧急且协

调一致的行动,不受控制 的高血压将继续夺走生命、 使家庭支离破碎,并削弱 国家经济。

- ★高血压导致的死亡每 年超过1000万人,比所有 重大传染病导致的死亡人数 总和还要多。然而, 在全球 卫生资金中, 用于高血压防 治的资金却不到 0.1%。
- ★随着人口老龄化, 高血压患病率不断上升,卫 生系统将会因心脏病发作、 卒中、痴呆和肾衰竭的治疗 费用不断增加而不堪重负。
- ★近80%未能有效控 制的高血压带来的负担落

在中低收入人群中, 加剧 了人群间生活质量的差距 和经济压力。

解决方案

经实践证实,有效的 四项行动可以帮助各国在 2030年前将高血压控制率 提高到 50%。

- ★使用标准化治疗方 案, 为所有患者提供负担 得起且可靠的治疗。
- ★将血压筛查和治疗作 为基层医疗日常门诊服务。
- ★将高血压控制列为 国家优先事项,获得国内 投资和创新融资的支持。

★使用数字化监测系 统透明地监测和公开报 告血压控制率, 以增强问 责制。

全球高血压防控行动倡议

呼吁制定相关政策和 投资, 使控制高血压这一 当今最有效且最具成本效 益的公共卫生干预措施之 一在全球范围内成为现实。

★加入由"决心拯救 生命"组织以及来自13个 国家的19个共同牵头方发 起的这一行动呼吁,在25 年内,推动实现预防7500 万例死亡以及1.5亿例心脏

病发作和中风的目标。

- ★签署这一倡议意味 着承诺帮助提高公众意 识,并向各国政府、资助 者和私营部门倡导保护 全球十亿人的心脏健康和 生计。
- ★每投资1美元用于 高血压控制, 可产生高达 18 美元的经济回报, 既能 拯救生命, 又能增强经济 实力。



关联 扫一 读全 文

复旦大学附属华山 医院皮肤科吴文育教授 和林尽染教授团队发表 的一项研究显示, 选择 性 Janus 激酶 1 (JAK1) 抑制剂乌帕替尼对于既 往系统糖皮质激素、JAK 抑制剂或生物制剂等治 疗无应答或应答不足的 患者仍可实现显著毛发 再生,提示乌帕替尼或 成为难治性斑秃患者的

重要治疗选择之一。(J

Am Acad Dermatol. 5 月 6

日在线版)

日前,《新英格兰 医学杂志》在线发表了 备受瞩目的Ⅲb期临床 试验(SURMOUNT-5) 结果, 首次以头对头随 机对照设计比较了替尔 泊肽与司美格鲁肽在治 疗非糖尿病肥胖患者中 的减重疗效和安全性, 为新一代减重药物的临 床选择提供了直接证据。 结果显示, 在肥胖但无 糖尿病的受试者中,与 司美格鲁肽治疗相比, 替尔泊肽特治疗在第72 周时在体重和腰围减少 方面更优。(N Engl] Med.5 月 11 日在线版)

全国致心律失常性心肌病注册研究结果出炉

医师报讯 (融媒体 记者 黄晶) 日前, 中国 医学科学院阜外医院吴灵 敏、陈亮教授团队发表 ChinaCORE ACM 注册登 记研究成果,系统揭示了 中国致心律失常性心肌病 (ACM) 患者的自然病 程和预后特征。(JACC Asia.5 月 10 日在线版)

研究涵盖全国14家 医学中心, 历时15年 (2009-2024年),纳入 了来自28个省级行政区的 622 例受试者,包括确诊或 临界诊断的 ACM 患者及 其基因型阳性亲属。

结果显示, ACM患 者首发症状的中位年龄为 33.0岁,10%的受试者具 有致心律失常性右室心肌

病(ARVC)家族史, 2.4% 有扩张型和(或)肥厚型 心肌病家族史, 9.2%有室 性心律失常家族史。

临床表现方面,259 例(41.6%)出现心律失常 相关症状,包括心悸、头 晕、出汗、晕厥等; 67 例 (10.8%)以心脏性猝死为 首发表现; 111 例 (17.8%) 出现心力衰竭症状,其中 NYHA心功能Ⅲ级和Ⅳ级 分别占17.4%和9.6%。值 得注意的是,98例(15.8%) 患者在18岁前即出现症状。

结局方面,255例 (41.0%)受试者出现恶 性室性心律失常,136例 (21.9%)发展为终末期心衰, 其中35例因心衰而死亡, 101 例接受心脏移植手术。

肺结节活检:支气管镜比穿刺安全 准确性相当

医师报讯 (融媒体记 者宋箐)日前,美国胸科学 会年会公布 VERITAS 试验 结果, 证实导航支气管镜的 活检策略在诊断效能上不 劣于传统 CT 引导下的经胸 壁穿刺活检,而且安全性更 高。该项研究结果在《新英

验,首次直接比较了电磁导 航支气管镜与 CT 引导下经 皮针吸活检在 10~30 mm 外 周肺结节患者中的诊断准 确性。研究对象为临床评 估癌症风险为中度至高度 的患者。研究将"诊断准 确性"定义为:在12个月 随访内,活检结果(恶性 或特异性良性病变)被临 床确认为正确的比例。

结果显示,导航支气 管镜在诊断准确性方面不 劣于经胸壁穿刺活检(设 格兰医学杂志》同步在线发 定的非劣效性界值为 10 个 表。(N Engl J Med.5 月 18 百分点),且在并发症方 面明显优于后者,尤其是 VERITAS 研究是一项 在气胸、需住院处理的气 多中心、随机、非劣效性试 胸和需胸腔引流的发生率 上。更令人兴奋的是,导 航支气管镜的诊断准确率 为 79.0%,显著高于先前预 期,而经胸穿刺活检的诊 断准确率为73.6%,反而相 对较低。



儿童肾病综合征新方案有望改写全球治疗指南

学医学院附属儿童医院毛 效与安全性双优新选择。 (JAMA Pediatr.5 月 12 日 在线版)

医师报讯 (融媒体记 科学设计,将 270 例 2~18 倍(HR=2.86,95%CI: 者 周思思)日前,浙江大 岁频繁复发型及激素依赖 1.79~4.76, P<0.001)。 型肾病综合征患儿随机分 建华教授领衔国内 12 家顶 人他克莫司组与霉酚酸酯 莫司组还展现出全方位 级三甲医院发表重大成果, 组,配合糖皮质激素阶梯 亮眼优势——中位无复 为儿童肾病综合征提供疗 减量方案,展开为期1年 发生存期延长超60 d 的治疗观察。

组患儿1年无复发生存率 (17.78% 与 41.48%), 该研究团队以严谨的 较霉酚酸酯组跃升 1.86 激素累积用量更降低 35%

更令人振奋的是, 他克 (323.99 d与 263.21 d), 数据显示,他克莫司 年复发率锐减近六成

(0.22 与 0.34 mg/kg/day), 而两组安全性指标旗鼓 相当。

该研究成果为儿童频 繁复发型及激素依赖型肾 病综合征治疗策略提供了 重要循证,同时也让困扰 临床用药的"他克莫司 or 霉酚酸酯"有了"高证据 等级的循证答案"。