# 慢性肾病伴难治性高血压六点建议

▲ 本报记者 董杰

高血压与肾脏病是 一对"难兄难弟", 当肾脏病患者同时合 并难治性高血压时, 则成为临床中更棘手 的问题。

难治性高血压指在 改善生活方式的基础上, 足量足疗程(≥3个月) 合理使用3种或3种以 上降压药物(含利尿剂), 高血压控制仍然不达标。

难治性高血压的诊 断为排除性诊断,应该 在逐步排除假性难治性 高血压、继发性高血压 的基础上来诊断。

有研究显示,慢性 肾病患者并发难治性高 血压的发病率正逐渐增 加,而慢性肾病也会影 响难治性高血压患者的 预后。近日,《柳叶刀》 杂志一篇文章对 3~5 期 (未透析)慢性肾病合 并难治性高血压进行了 综述,提出治疗建议。 (Lancet.2015,386:1588)

慢性肾病合并难治性高 血压六点建议 ☆建议难治性高血压患者低盐 饮食,应用3种足量降压药 联合治疗, 并适当辅以 其他降压药治疗。 ☆部分患者血压控 制不良由用药依从性 较差所致,并非真正 的难治性高血压,要避 免误诊。 ☆多种药物联合应用可增加药物相关不良反应, 导致患者用药依从性下降。应尽量选用复方制剂,以 减轻患者用药负担, 改善家庭血压监测、定期复查的 依从性。 ☆当治疗效果不佳时,应该对患者限盐,使用利尿剂,最 后选择增加降压药剂量。 ☆肾交感神经射频消融与颈动脉窦电刺激等新型难治

性高血压治疗技术仍处于研究阶段, 在晚期慢性肾病患

☆公共卫生政策制定者应采取措施,推动

早期诊断、食物限盐、改善患者依从性、

报销政策及家庭血压监测等。

## 透析伴难治性高血压治疗策略

▲ 福建医科大学附属第一医院 万建新

目前难治性高血压的治疗主 要包括生活方式干预、药物治疗 和非药物治疗。

其中,矫正不良的生活方式 是高血压治疗的基石。

药物治疗方面,尽管有很多 药物可供选择,但难治性高血压 的药物治疗仍是难题。如何选择 合理、有效的药物对医生而言是 个挑战。同时,患者的经济状况 也影响对药物治疗的依从性。具 体措施主要有优化联合用药,根 据家庭自测血压和 24 h 动态血压 选择正确服药时间,对治疗依从 性进行评估。

此外, 还可应用非药物治疗 措施,包括透析方式调整、肾交 感神经射频消融、颈动脉窦电刺 激、肾动脉栓塞或切除术、持续 性正压诵气等。

透析方式的调整主要包括增 加透析频率(如每日夜间透析)、 血液灌流的应用。

近年来,尽管已有少量终末 期肾脏病透析患者成功接受了肾 交感神经射频消融,但其在慢性



万建新 教授

肾脏病患者上的应用还有一定局

颈动脉窦电刺激是近年开始 被重视的一种高血压非药物治疗 方法。由于难治性高血压患者日 益增多,又重新恢复了此项技术 的兴趣。

传统肾脏切除术是治疗尿 毒症期维持性血液透析后顽固性 高血压的有效方法,肾动脉栓塞 术作为一种补充或代替的治疗方 法,尤其适用于身体状况较差不 宜外科手术及自身不愿意行大创 伤外科手术患者。



# 杏雪゜临床获益明确

有效改善心、脑血管疾病及认知障碍

者中的疗效仍需进一步验证。

编者按: 杏雪\*舒血宁注射液可扩张血管,改善微循环,经过多年临床验证,杏雪\*治疗缺血性心脑血管疾病(如 冠心病、心绞痛、脑栓塞、脑血管痉挛)、认知障碍(如血管性痴呆、阿尔茨海默症)等疗效确切,下文中将予以 分别阐释。

# 舒血宁注射液 全程阿护 心脑健康 联系电话: 0451-87105222

#### 心血管领域

#### 杏雪 <sup>®</sup> 有效改善冠心病心绞痛

血性心血管疾病(如冠心病、心绞痛 等)的治疗,得到多项研究的证实。

一项关于舒血宁对不稳定型心绞 痛患者研究证实, 舒血宁治疗不稳定 型心绞痛疗效确切,不但能有效改善 不稳定型心绞痛患者的血清脑钠肽、 高敏 C 反应蛋白水平,还能明显改善 患者粥样斑块大小及斑块厚度,对不 稳定型心绞痛具有一定的阻断和逆转 进行了有力证实。

在心血管领域, 杏雪\*可用于缺 作用。此外, 舒血宁的临床疗效还得 到 Meta 分析的证实, 《舒血宁注射 液辅助治疗不稳定型心绞痛疗效的 Meta 分析》一文显示,舒血宁治疗 不稳定型心绞痛在减少心绞痛发作, 以及改善心电图疗效方面明显优于常 规治疗。

> 以上多项研究从循证医学上,对 舒血宁在心血管疾病防治上的有效性

### 认知障碍

#### 杏雪 <sup>®</sup> 改善认知功能障碍

杏雪 \* 在治疗阿尔茨海默 症、血管性痴呆、轻微认知障 碍上的疗效也得到研究证实。

《舒血宁治疗脑梗死后认 知障碍的临床研究》结果显示, 舒血宁有助于脑梗死合并认知 障碍患者神经功能的恢复,同 时能显著改善患者的认知功能 (图1)。

另外,有研究显示,杏雪\* 用于血管性痴呆治疗的临床疗 效较好,能减少并发症的发生, 治疗后患者恢复得较快, 痛苦 小,应在临床治疗的过程中积 极地推广应用。

更值得欣喜的是,《中国 痴呆与认知障碍诊治指南》中 提出中药干预在痴呆、轻度认 知功能障碍中的治疗效果,指 出中药含有多种有效成分,可 同时发挥多种作用靶点的药理




图 1 两组治疗前后 NIHSS 评分、Barthel 指数评 分比较(分)

注:与本组治疗前相比,\*P<0.01;与对照组治疗后比较,

特点,符合阿尔茨海默症多因 素、多种病理机制的变性病发 病特点。指南列举多项国内外 相关研究,特别提出银杏叶提 取物可起到改善认知功能障 碍、提高日常生活能力、缓解 谵妄等精神症状的作用, 值得 临床推广。

编后语: 经过多年 临床验证, 杏雪®舒血 宁注射液在治疗心脑血 管疾病及认知障碍上的 疗效显著。此外,银杏 叶提取物还被写进《中 国痴呆与认知障碍诊治 指南》, 其改善认知功 能障碍、缓解谵妄等方 面的作用获得认可。

#### 脑血管领域

14. indd 1

### 杏雪 <sup>®</sup> 治疗急性脑梗死显效

脑血管领域, 杏雪\*可用于缺血 性脑血管疾病(如脑栓塞、脑血管 痉挛等)的治疗,疗效同样得到临 床研究的印证。

研究显示,杏雪\*可提高血清中 血管内皮生长因子水平,有效降低 患者血清中血管性血友病因子、基性脑梗死方面安全、有效。

质金属蛋白酶 -9 水平, 改善患者脑 缺血区域再灌注, 改善微循环, 减 轻炎症反应,保护血管内皮功能, 起到神经保护的作用。另外,一项 纳入33篇随机对照文献、3305例样 本 Meta 分析证实:舒血宁在治疗急

2015/11/24 22:26:1