



陈锦飞 教授

ASCO 一直都是新药的重要舞台，今年胃癌也有数个新药公布了其研究结果。

MM-111 对于 HER2 阳性患者,紫杉醇、曲妥珠单抗联合或不联合 MM-111 用于晚期胃癌的 II 期临床研究,其结果显示,MM-111 并不能延长 HER2 阳性的患者的 OS 和 PFS。

复旦大学附属中山医院王妍教授团队研究不可切除局部胃癌的新辅助治疗：卡培他滨奥沙利铂方案(XELOX)或联合表阿霉素(EOX)。结果提示，XELOX 方案对比EOX 组，疗效相似(RR、手术完全切除率和OS)，但毒副反应更轻。

今年的 ASCO 出现许多胃癌手术治疗的相关研究。

此外,机器人手术与腹腔镜手术对比,在不肥胖的患者中,机器人手术在D2淋巴结清扫术式中具有出血少等优势。

胃癌的靶向治疗与其他实体瘤尚有很大差距，HER2 阳性患者可用曲妥珠单抗靶向治疗，而这一人群占比不到 15%。

Ajani 强调, 所有无法手术切除而需化疗的晚期胃癌患者都应行免疫组化检测 HER2。美国临床肿瘤学会、美国病理学家协会以及美国临床病理学学会均支持胃癌患者常规进行 HER2 检测。

- ★胃腺癌患者无需重复检测 HER2;
- ★无证据表明病情恶化时应继续使用曲妥珠单抗;
- ★HER2 阳性时可加用曲妥珠单抗, 但 HER2 检测可能需要 2 周时间, 在此期间, 不应为等待检查结果而延误化疗。

目前，免疫治疗在肿瘤领域中研究火热，胃癌作为大病种也不例外，从今年的 ASCO 来看，免疫治疗的研究就有 4 项，其中 3 项是 I / II 期研究，结果喜忧参半。

Avelumab (anti-PD-L1) 的 I B 期研究证实, 其具有较好的耐受性及显示了初步的疗效。另一项研究公布了 Pembrolizumab 与 5-FU 及顺铂联用于晚期胃癌一线治疗的初步安全性的结果, 显示 Pembrolizumab 具有良好的耐受性, 而其疗效数据仍有待于时日。