（上接第16版）

06 新闻 NEWS 医师报 2018年4月19日

柳叶刀子刊刊发“2003-2015年中国癌症生存率数据”

我国癌症患者5年生存率提升10%

THE LANCET Global Health

Changing cancer survival in China during 2003-15: a pooled analysis of 17 population-based cancer registries

肿瘤

根除幽门螺旋杆菌降低胃癌发生率

妇产

孕前 孕期使用叶酸和复合维生素可降低“后患”

公共健康

烟草价格提50% 可避免医疗支出

癌症患者生存率提升

赫捷院士等发表中国癌症研究大数据

由**国家癌症中心赫捷院士、陈万青教授**领衔发表于《柳叶刀·全球卫生》杂志的研究表明，我国17个癌症登记处覆盖人群的癌症生存率在2003-2015年，我国癌症患者5年生存率提升10%。

从2003-2005年到2012-2015年，年龄标准化5年相对生存率在大多数癌种均有所增加，其中生存率稳定增长且增幅最大的是子宫体癌（每个时间段平均变化率5.5%）、甲状腺癌（5.4%）、宫颈癌（4.5%）、骨肿瘤（3.2%）。仅胰腺癌和胆囊癌未观察到生存率改善。（Lancet Global Health.2018,6:e555）

结果显示，从2003-2005年到2012-2015年，所有癌症合并分析的年龄标准化5年相对生存率从30.9%提高到40.5%。

除肾癌、膀胱癌和喉癌外，几乎所有癌症类型的女性患者生存率均优于男性患者。所有癌症合并分析时，生存率的提高在女性患者较男性患者更明显（3.5%与2.3%）。（《医师报》2018年4月19日545期第6版）

四川大学华西第二医院全国剖宫产调查

中国剖宫产率稳步下降

《英国医学杂志》发表四川大学华西第二医院全国妇幼卫生监测办公室的全国剖宫产研究，首次报道中国成功逆转剖宫产率近20年的持续上升趋势，成为目前全球唯一能在高剖宫产率基础上实现控制并降低剖宫产率的国家。

该研究纳入2012年~2016年在438家中国危重孕产妇监测医院收集的近700万出生数据，分析发现，剖宫产率从2012年的45.3%下降至2016年的41.1%。在校正了一系列潜在影响因素后，剖宫产率下降了18%。

其中，初产妇和既往无剖宫产史的经产妇下降尤为显著。研究还指出，同时期的围产儿死亡率从2012年的10.1‰下降到2016年的7.2‰，而孕产妇死亡率的变化没有统计学意义，这意味着，剖宫产率的下降并没有对母婴安全造成不良影响。

研究者认为，尽管本研究无法估计初产妇没有选择剖宫产的原因是否是因为有生育二孩的意愿，但可以观察到的变化是：受放宽独生子女政策影响，高龄和有既往剖宫产史的孕妇比例逐年上升，这些因素都可能导致剖宫产率的进一步升高。

现实中，我国剖宫产率仍呈稳步下降趋势，主要原因可能是一直以来从国家到地方各级卫生行政部门以及各医疗机构实施的一系列控制剖宫产率、改善母婴健康的政策和措施。

中国十大变迁疾病谱

医师报 2018年4月19日 关注 FOCUS 03

王辰院士牵头最新大规模呼吸病流行状况研究

我国1亿人有慢阻肺 为防控短板

▲医师报记者 报道

数读慢阻肺

研究背景

研究启示

控烟与普及肺功能检查为慢阻肺防控的关键

幕后故事

王辰院士发布肺部健康研究首项成果

慢阻肺与糖尿病等量齐观

王辰院士在《柳叶刀》发表大规模人群研究《中国成人肺部健康研究》的首项成果。研究首次明确我国慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）患者人数约1亿，已经成为与高血压、糖尿病“等量齐观”的慢性疾病，构成重大疾病负担。（《柳叶刀》2018年9月4日在线版）

研究显示，我国20岁及以上人群慢阻肺患病率8.6%。其中，男性患病率显著高于女性（男性11.9%，女性5.4%）；农村患病率显著高于城市（农村9.6%，城市7.4%）。20~39岁人群中，慢阻肺患病率为2.1%，40岁及以上人群中，慢阻肺患病率为13.7%。

我国慢阻肺患者人数约9990万，男性患者人数6840万，女性患者人数3150万；农村患者人数5970万，城市患者人数4020万。

慢阻肺患病率随年龄增长显著升高。40岁以上人群慢阻肺患病率13.7%，平均每8个人中就有1例慢阻肺患者。60岁以上人群慢阻肺患病率为27.4%，平均每4个人中就有1例慢阻肺患者。

吸烟是慢阻肺最重要的危险因素。吸烟人群慢阻肺患病率为13.7%，平均每8个人中就有1例慢阻肺患者。吸烟人群慢阻肺患病率超过不吸烟人群患病率1倍。60岁以上吸烟人群慢阻肺患病率超40%，吸烟时间越长、吸烟量越大，慢阻肺患病风险越高。

此外，我国慢阻肺知晓率及肺功能检查普遍较低。受访者中仅约10%知道“慢阻肺”这一疾病；不足10%曾接受过肺功能检查；不足3%的患者知道自己患有慢阻肺。

在所有慢阻肺患者中，近九成此前没有得到明确诊断；超过60%患者无咳嗽、咳痰、喘息等症状。无症状患者需主要依靠肺功能检查以发现诊断慢阻肺。（《医师报》2018年4月19日545期第3版）

郎景和院士牵头宫颈癌诊疗大数据研究

农村宫颈癌患者占比高

历时近4年，由**郎景和院士**牵头，南方医科大学南方医院组织的中国大陆部分地区（19个省市48个地区）宫颈癌临床诊疗大数据回顾性研究发现，25 547例宫颈癌患者中，农村患者占16 483例（64.5%），城市患者占9064例（35.5%）。（《中国实用妇科与产科杂志》2018,34:41）

研究发现，宫颈癌可发生于任何年龄的妇女，20岁以前罕见，40~60岁为发病高峰，60岁以后呈下降趋势。

从各年情况来看，鳞癌占比均超过75%。鳞癌患者占总患者的78.2%，腺癌占7.3%，鳞癌、腺癌之比为10.6:1。其中鳞癌占比由2004年的84.8%到2016年的73.9%，有下降的趋势。鳞癌患者年龄（47.8±9.7）岁，腺癌患者年龄（46.5±9.9）岁，两者之间差异有统计学意义（P<0.001），腺癌患者较鳞癌患者年轻。

我国宫颈癌发病率存在民族差异，居前三位的是维吾尔族（17.27/10万）、蒙古族（15.72/10万）和回族（12.39/10万）。

此外，我国宫颈癌的分布主要集中在中西部地区，农村高于城市、山区高于平原。

王辰院士等发布超10万患者研究数据

肺栓塞死亡率下降

国家呼吸疾病临床研究中心、中日医院呼吸与危重症医学科王辰院士等通过对2007~2016年90家医院的数据进行分析发现，十年来肺栓塞住院率（伴或不伴深静脉血栓形成）从1.2/10万人增加到7.1/10万人，增加6倍。死亡率从8.5%降低到3.9%。（Chest.11月9日在线版）

研究显示，十年来这90家医院共诊断了105,723例静脉血栓栓塞症，43,589例为肺栓塞患者（伴或不伴深静脉血栓形成），62,134例为深静脉血栓形成。

其中，年龄、性别校正的住院率静脉血栓栓塞症从3.2/10万人上浮到17.5/10万人；深静脉血栓形成住院率从从2.0/10万人增加到10.5/10万人。

虽然住院率大幅上升，但静脉血栓栓塞症院内死亡率从4.6%降低到2.1%；深静脉血栓形成死亡率从2.5%降低到0.9%。

此外，静脉血栓栓塞症的住院时长也从2007年的平均14 d缩短到2016年的11 d；肺栓塞（伴或不伴深静脉血栓形成）住院时长十年来缩短最多达29.4%；深静脉血栓形成住院时长缩短最少，从12 d缩短到9 d。

静脉血栓栓塞症住院率在老年男性和北方人中更高；死亡率在癌症患者和查尔森合并症指数＞2的患者中最高。在肺栓塞和深静脉血栓形成患者中也是如此。（《医师报》2018年12月6日576期第6版）

06 新闻 NEWS 医师报 2018年12月6日

Chest杂志刊登我国90家医院超10万患者调查

肺栓塞十年增6倍 死亡率从8.5%降至3.9%

行业资讯

中山大学孙逸仙纪念医院团队实施全球首例新型微创术式

腹腔镜下保留十二指肠的全胰头切除术亮相

张俊平团队研究登陆美国神经肿瘤学会年会