





注射用贝利尤单抗^(倍力腾)



本品与常规治疗联合，适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。



本品通过静脉输注给药，推荐的给药方案为10mg/kg，前3次每2周给药一次，随后每4周给药一次。

注射用贝利尤单抗简短说明书

请仔细阅读药品使用说明书，如未附请参见药品说明书。

【药品名称】

通用名称：注射用贝利尤单抗
商品名称：倍力腾

【性状】

本品为白色冻干粉，密封于玻璃瓶内并置于铝塑包装中。本品（即：10mg/0.5mL）为白色冻干粉，密封于玻璃瓶内并置于铝塑包装中。本品（即：10mg/0.5mL）为白色冻干粉，密封于玻璃瓶内并置于铝塑包装中。

【规格】

10mg/0.5mL、50mg/2.5mL

【用法用量】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【不良反应】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【禁忌】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【注意事项】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【规格】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【规格】本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【用法用量】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【不良反应】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【禁忌】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【注意事项】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【规格】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

【用法用量】

本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。本品为注射用冻干粉，使用前需先用注射用水溶解。

倍力腾
Benlysta



倍力腾（B2）注射液（10mg/0.5mL）
倍力腾（B2）注射液（50mg/2.5mL）